

¿Puedo ir a la escuela hoy?

Examen de detección de síntomas en el hogar para padres y personal

Los padres y tutores pueden usar estas listas de verificación de síntomas para determinar cuándo mantener a su hijo en casa según el nivel de transmisión de COVID-19 en su comunidad (por ejemplo, ¿la comunidad está en Proteja a su vecino o es más segura en En casa o quedarse en casa). El personal de la escuela también puede usar esta herramienta para determinar si necesitan quedarse en casa. Alguna el estudiante o el personal diagnosticado con COVID-19 o que sea un contacto cercano de un caso de COVID-19 no debe ir a la escuela y debe aislar o poner en cuarentena de acuerdo con las recomendaciones de salud pública.

Estas listas se refieren solo a nuevos síntomas o un cambio en los síntomas habituales. Un estudiante / personal no debe quedarse en casa para los síntomas habituales que experimentan debido a una enfermedad crónica, a menos que sean peores de lo habitual. Estas pautas son adicionales a su orientación escolar habitual (por ejemplo, un niño con vómitos tampoco debe asistir a la escuela basado en la orientación escolar habitual).

Si su hijo está experimentando algún síntoma potencialmente mortal, llame al 911.

Baja transmisión comunitaria (proteja a sus vecinos):

Si alguno de los siguientes síntomas está presente, mantenga al niño en casa / quédese en casa, informe a la escuela de síntomas y comuníquese con un proveedor de atención médica sobre las pruebas de COVID-19 y los próximos pasos para el tratamiento.

- Sensación de fiebre, escalofríos o temperatura de 100.4 °F o más.
- Tos persistente nueva o inexplicable.
- Dificultad para respirar.
- Respiración dificultosa.
- Pérdida del gusto o el olfato.

Transmisión comunitaria sostenida (más seguro en el hogar o que se quede en el hogar):

Si alguno de los siguientes síntomas está presente, mantenga al niño en casa / quédese en casa, informe a la escuela de síntomas y comuníquese con un proveedor de atención médica sobre las pruebas de COVID-19 y los próximos pasos para el tratamiento.

- Sensación de fiebre, escalofríos o temperatura de 100.4 °F o más.
- Tos persistente nueva o inexplicable.
- Dificultad para respirar.
- Dificultad para respirar.
- Pérdida del gusto o el olfato.
- Fatiga.
- Dolores musculares.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de garganta.
- Náuseas o vómitos.
- Diarrea.
- Secreción nasal o congestión.